



TEST DE GLÚCIDOS

Opciones múltiples (una sola respuesta verdadera)

- 1. LOS GLÚCIDOS FORMADOS POR MÁS DE UN MONOSACÁRIDO:**
 - a) Son todos holósidos.
 - b) Tienen todos función de mantenimiento.
 - c) Han desprendido moléculas de agua en su formación.
 - d) Son todos polisacáridos.
 - e) Todas las anteriores son falsas.
- 2. EN UN MONOSACÁRIDO CON CINCO ÁTOMOS DE CARBONO:**
 - a) Podemos encontrar un grupo aldehído o un grupo cetona.
 - b) Encontramos al menos un grupo carboxilo.
 - c) Existen 25 estereoisómeros posibles.
 - d) Hay cinco grupos OH.
 - e) Todas las anteriores son verdaderas.
- 3. LA α -D-GLUCOPIRANOSA Y LA β -D-GALACTOPIRANOSA:**
 - a) Son anómeros entre sí.
 - b) Son enantiómeros entre sí.
 - c) Son diaestereoisómeros entre sí.
 - d) Son epímeros entre sí.
 - e) Todas las anteriores son falsas.
- 4. CUANDO EL C1 UNA ALDOHEXOSA REACCIONA CON EL OH DEL C5:**
 - a) Forma una furanosa.
 - b) Aparecen dos nuevos epímeros.
 - c) Se desprende una molécula de agua.
 - d) Forma un ciclo del mismo número de lados que la fructosa.
 - e) Todas las anteriores son falsas.
- 5. EL MONOSACÁRIDO QUE NO ES HEXOSA ES:**
 - a) Arabinosa.
 - b) Galactosa.
 - c) Altrosa.
 - d) Manosa.
 - e) Fructosa
- 6. LA α -D-2DESOXIRRIBOSA**
 - a) Es un anómero de la β -D-2-desoxirribosa.
 - b) Forma parte del ADN.
 - c) Ha perdido el OH del carbono 2.
 - d) Es una furanosa.
 - e) Todas las anteriores son verdaderas.



- 7. CUANDO SE CICLA LA L-SORBOSA**
- Se puede formar una α -D-Sorbofuranosa.
 - Se puede formar una β -L-Sorbofuranosa.
 - Se puede formar una α -D-Sorbopiranososa.
 - Se puede formar una β -L-Sorbopiranososa.
 - Todas las anteriores son falsas.
- 8. La β -D-GALACTOPIRANOSIL (1 \star 6) β -D-MANOPIRANOSA**
- Será un disacárido con función de reserva.
 - Carecerá de poder reductor.
 - Ha desprendido una molécula de agua en su formación.
 - Tiene un piranososa y una furanososa.
 - Todas las anteriores son falsas.
- 9. PODEMOS ENCONTRAR EN UN POLISACÁRIDO DE FUNCIÓN ESTRUCTURAL:**
- Ramificaciones $\alpha(1\rightarrow6)$.
 - Más de 15 monosacáridos distintos.
 - N-acetil- β -D-Glucosamina.
 - Una agrupación en forma de gránulos en el citoplasma.
 - Todas las anteriores son falsas.
- 10. ES UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CELULOSA:**
- Estar formada exclusivamente por glucosas.
 - Tener enlaces $\beta(1\rightarrow4)$ y $\beta(1\rightarrow6)$
 - Conferir resistencia a la pared celular de los hongos.
 - Ser digerida por glucosidasas.
 - Todas las anteriores son verdaderas.
- 11. SON HETEROPOLISACÁRIDOS:**
- El agar-agar, el ácido hialurónico y la isomaltosa.
 - La celulosa, la isomaltosa y los mucílagos.
 - El agar-agar, los mucílagos y las pectinas.
 - Las pectinas, la celulosa y el ácido hialurónico.
 - Todas las anteriores son falsas.
- 12. LA DIFERENCIA ENTRE LA AMILOPECTINA Y EL GLUCÓGENO ES:**
- Que la primera contiene glucosas y la segunda maltosas.
 - Que la primera tiene enlaces β y la segunda α .
 - Que la primera posee ramificaciones β y la segunda α .
 - Que la primera posee ramificaciones $\beta(1\rightarrow6)$ y la segunda no.
 - Todas las anteriores son falsas.
- 13. ES CARACTERÍSTICO DE LA MOLÉCULA DE GLUCÓGENO:**
- Necesitar la $\alpha(1\star6)$ glucosidasa para su digestión.
 - Encontrarse formando gránulos en el citoplasma de la células animales.
 - Encontrarse en el músculo y en el hígado.
 - Liberar glucosas con más rapidez que el almidón.
 - Todas las anteriores son verdaderas.